

Džanan Berberović

UDK 159.922.1

Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla,
BiH**RAZLIKE U SEKSUALNOJ KOMPULZIVNOSTI, DEPRESIVNOSTI I ANKSIOZNOSTI IZMEĐU NEHETEROSEKSUALNIH ŽENA IMUŠKARACA**

Rad ispituje polne razlike u nivou seksualne kompulzivnosti, depresivnosti i anksioznosti kod neheteroseksualnih (biseksualnih i homoseksualnih) studenata. Istraživanjem je obuhvaćeno 119 studenata iz Srbije i BiH koji su odredili svoju seksualnu orijentaciju kao biseksualnu ($N = 76$, $N_{\text{ž}} = 46$; $N_{\text{m}} = 30$) ili homoseksualnu ($N = 43$; $N_{\text{ž}} = 19$, $N_{\text{m}} = 24$). Seksualna kompulzivnost merena je Skalom seksualne kompulzivnosti (SSK), depresivnost Bekovim inventarom depresije (BDI), a anksioznost Spilbergerovim inventarom anksioznosti kao crte (STAI-T). Dvofaktorska ANOVA je pokazala postojanje polnih razlika u nivou seksualne kompulzivnosti $F(1, 115) = 24.963$, $p = .000$, ali ne i u depresivnosti i anksioznosti. Neheteroseksualna orijentacija se, posmatrana zasebno, nije pokazala značajnim faktorom ni u jednom od ispitanih psihopatoloških fenomena. Biseksualni muškarci postižu značajno više nivoe seksualne kompulzivnosti ($M = 22.67$; $SD = 9.345$) od biseksualnih žena ($M = 17.827$, $SD = 8.232$), $t = 2.354$, $df = 74$, $p < .05$. Kod homoseksualnih žena nije identifikovan niti jedan klinički značajan slučaj seksualne kompulzivnosti, dok je među homoseksualcima prevalencija iste značajno veća, $\chi^2 = 9.148$; $df = 1$, $p < .05$. Raspravlja se o rezultatima, zaključcima, ograničenjima istraživanja, kao i preporukama za buduća istraživanja.

Ključne reči: Seksualna kompulzivnost, depresivnost, anksioznost, seksualna orijentacija

DIFFERENCES IN SEXUAL COMPULSIVITY, DEPRESSIVENESS, AND ANXIETY BETWEEN NON-HETEROSEXUAL FEMALES AND MALES

The research explores sex differences in sexual compulsivity, depression, and anxiety levels in non-heterosexual students. The sample consisted of 119 students from Serbia and B&H, who self-reported their sexual orientation as either bisexual ($N=76$, $N_{\text{f}}=46$; $N_{\text{m}}=30$) or homosexual ($N=43$; $N_{\text{f}}=19$, $N_{\text{m}}=24$). The Sexual Compulsivity Scale (SCS); the Beck Depression Inventory (BDI), and the Spielberger's State-Trait-Anxiety Inventory – Trait (STAI-T) were used to measure sexual compulsivity, depression, and anxiety levels, respectively.

Two-way ANOVA indicated sex differences in sexual compulsivity, $F(1,115)=24.963$, $p=.000$, but no sex differences were found in depression and anxiety. Non-heterosexual orientation was not significant factor in the three psychopathological phenomena. Bisexual males scored significantly higher in sexual compulsivity ($M=22.67$; $SD=9.345$) than bisexual females ($M=17.83$; $SD=8.23$), $t=2.354$, $df=74$, $p<.05$. No cases of clinically significant sexual compulsivity were found in homosexual females, but prevalence rate for homosexual males was significantly higher, $\chi^2=9.148$; $df=1$, $p<.05$. Results, conclusions, limitations of the study, and suggestions for future research are discussed.

Keywords: Sexual Compulsivity, Depression, Anxiety, Sexual Orientation